



*Acrothamnion preissii*  
Alga roja filamentososa que forma céspedes pardo-rojizos



*Asparagopsis armata*  
Matas rosadas formadas por plumeros



*Asparagopsis taxiformis*  
Matas pardo rojizas formadas por plumeros (ramas sin forma arpón)



*Caulerpa cylindracea*  
Tallos verdes en forma de racimo. Antes *C.racemosa*.



*Caulerpa taxifolia*  
Tallos de 10cm aplanados y en forma de pluma



Común creciendo en los tallos de *P.oceanica*



Ramas con forma de arpón  
Común sobre rocas



Común en Baleares  
Común sobre rocas



Habita diversos fondos y rocas  
Extendida en Baleares



Puede colonizar múltiples sustratos disponibles.

¡Ojo a las Invasoras!, Biodiversidad y especies de algas invasoras del Mediterráneo Balear, IMEDEA CSIC-UIB. <http://ojoinvasoras.info/>



©2015



*Acrothamnion preissii*  
Alga roja filamentososa que forma céspedes pardo-rojizos



*Asparagopsis armata*  
Matas rosadas formadas por plumeros



*Asparagopsis taxiformis*  
Matas pardo rojizas formadas por plumeros (ramas sin forma arpón)



*Caulerpa cylindracea*  
Tallos verdes en forma de racimo. Antes *C.racemosa*.



*Caulerpa taxifolia*  
Tallos de 10cm aplanados y en forma de pluma



Común creciendo en los tallos de *P.oceanica*



Ramas con forma de arpón  
Común sobre rocas



Común en Baleares  
Común sobre rocas



Habita diversos fondos y rocas  
Extendida en Baleares



Puede colonizar múltiples sustratos disponibles.

¡Ojo a las Invasoras!, Biodiversidad y especies de algas invasoras del Mediterráneo Balear, IMEDEA CSIC-UIB. <http://ojoinvasoras.info/>



©2015



*Lophocladia lallemandii*

Forma matas algodonosas color rojo/rosado/blanquecino



*Womersleyella setacea*

Alga filamentososa. Forma césped rojo/rosado/pardo



*Codium fragile* (sub. *fragile*)

Tallos verdes intenso de 20-30cm



*Stypopodium schimperi*

Alga parda en forma de abanico



¡REGISTRA TUS INVASORAS!



Habitualmente pegada a otras algas. Muy extendida en IB.



Fácil verla como epífita (cubriendo cualquier sustrato)



Hábitats calmados, rocosos y superficiales. No descrita en IB.



Puede confundirse con alga *Padina pavonica*. No descrita en IB.



¡ESCANEA!



*Lophocladia lallemandii*

Forma matas algodonosas color rojo/rosado/blanquecino



*Womersleyella setacea*

Alga filamentososa. Forma césped rojo/rosado/pardo



*Codium fragile* (sub. *fragile*)

Tallos verdes intenso de 20-30cm



*Stypopodium schimperi*

Alga parda en forma de abanico



¡REGISTRA TUS INVASORAS!



Habitualmente pegada a otras algas. Muy extendida en IB.



Fácil verla como epífita (cubriendo cualquier sustrato)



Hábitats calmados, rocosos y superficiales. No descrita en IB.



Puede confundirse con alga *Padina pavonica*. No descrita en IB.



¡ESCANEA!